

尿路結石予防のポイント

水分を十分に摂る

食事以外に1日2ℓ以上の水やお茶などを飲む

バランスの良い食事をする

1日3食を規則正しく
海藻・野菜・大豆製品を積極的に
動物性たんぱく質を食べ過ぎない

適度な運動をする

ウォーキングなどの適度な運動を続ける


お酒は適量を心がける

ストレスや過労を避ける

車でお越しの方



電車・バスでお越しの方



ESWL 体外衝撃波結石破碎治療

尿路結石症(腎結石・尿管結石)の治療に、
最新鋭の体外衝撃波結石破碎装置 **Piezolith 3000** を導入いたしました。



<問い合わせ先>

宝塚市立病院

泌尿器科

〒665-0827 兵庫県宝塚市小浜4丁目5-1

Tel: 0797-87-1161 (代表)

Fax: 0797-87-5624

ESWL 体外衝撃波結石破碎治療

尿路結石症（腎結石・尿管結石）の治療に、最新鋭の体外衝撃波結石破碎装置 **Piezolith 3000** を導入いたしました。

Piezolith 3000 (ドイツ、リチャード・ウルフ社製)




〔特長〕

- 強い痛みが少なく、麻酔等は不要です。
- 大多数は治療後、すぐ日常生活に戻れます。
- 再発の場合、何度でも治療できます。
- 他に、高血圧、心臓病、糖尿病などの疾患のある方、高齢者の方も当院、泌尿器科にご相談ください

Piezolith 3000の特徴は

- 超音波とX線による同時探査機能を備えているため、あらゆる部位の結石に対し治療を行うことが可能です。
- 結石破碎中は超音波で結石の破碎状況の観察を行いますので、X線被爆を最小限に抑えることができます。
- 圧電素子を用いた衝撃波発生装置を用いることにより、衝撃波による痛みを軽減し、無麻酔での確実な破碎治療を可能にしています。
- 一般に破碎しにくいといわれている尿管結石に対しても強力な破碎力により確実な効果をあげることができます。



破碎前の結石



衝撃波により砂状になった結石

ESWLを中心にした総合的尿路結石治療

- **Piezolith 3000** は、ほとんどあらゆる尿路結石 に対して良好な治療成績を示しますが、一部の症例では最新の内視鏡による治療を併用することによって、より安全で効果的な治療が可能となります。
- また、大きな結石では一度に全部砕かずに何回かに分けて破碎することで、合併症のない安全な治療を行うことができます。
- 当科では結石の状態によって、それぞれの治療法の利点を生かした最善の方法を総合的に判断し、治療を進めてまいります。