

化学療法レジメン

| 呼吸器領域 | | |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎 | CPハルス | CPA 500mg/body(d 1, 13日) |
| 中皮腫 | ニボルマブ | ニボルマブ 240mg/body(d 1, 13日) |
| | PEM/CBDCA(AUC6) | PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | PEM/CDDP | PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CDDP 75mg/m2(d 1, 20日) |
| 非小細胞癌 | ニボルマブ | ニボルマブ 240mg/body(d 1, 13日) |
| | DTX | DTX 60mg/m2(d 1, 20日) |
| | ヘム7ロリスマブ + PEM/CBDCA(AUC5) | ヘム7ロリスマブ 200mg/body(d 1, 20日), PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 5(d 1, 20日) |
| | PEM | PEM 500mg/m2(d 1, 20日) |
| | PEM/CBDCA(AUC6) | PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | CP(PTX/CBDCA AUC 6) + Bmab | PTX 200mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日), Bmab 15mg/kg(d 1, 20日) |
| | PEM/CBDCA(AUC 6) + Bmab | PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日), Bmab 15mg/kg(d 1, 20日) |
| | Bmab | Bmab 15mg/kg(d 1, 20日) |
| | nabPTX/CBDCA(AUC6) | nabPTX 100mg/m2(d 1・8・15, 6日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | adjuvantVNR/CDDP | VNR 25mg/m2(d 1・8・15・22, 6日), CDDP 50mg/m2(d 1・8, 20日) |
| | PEM/CDDP | PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CDDP 75mg/m2(d 1, 20日) |
| | RAM + DTX | RAM 10mg/kg(d 1, 20日), DTX 60mg/m2(d 1, 20日) |
| | ヘム7ロリスマブ | ヘム7ロリスマブ 200mg/body(d 1, 20日) |
| | アテゾリスマブ | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日) |
| | VNR/CDDP | VNR 25mg/m2(d 1・8, 13日), CDDP 80mg/m2(d 1, 20日) |
| | PTX/CBDCA(AUC 6) | PTX 200mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | RT併用4週毎S1/CDDP | S1 80mg/m2(d 2~15, 13日), CDDP 60mg/m2(d 1, 27日) |
| | テュルハルマブ | テュルハルマブ 10mg/kg(d 1, 13日) |
| | アテゾリスマブ + PTX/CBDCA(AUC6) + Bmab | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日), PTX 175mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日), Bmab 15mg/kg(d 1, 20日) |
| | CBDCA(AUC 5) + S-1 | TS-1 80mg/m2/日(d 2~15, 6日), CBDCA AUC 5(d 1, 20日) |
| | ヘム7ロリスマブ + nabPTX/CBDCA(AUC6) | ヘム7ロリスマブ 200mg/body(d 1, 20日), nabPTX 100mg/m2(d 1・8・15, 6日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | RT併用PTX/CBDCA(AUC2) | PTX 40mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 6日), CBDCA AUC 2(d 1・8・15・22・29・36, 6日) |
| | ヘム7ロリスマブ + PTX/CBDCA(AUC6) | ヘム7ロリスマブ 200mg/body(d 1, 20日), PTX 200mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| | アテゾリスマブ + PEM/CBDCA(AUC5) | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日), PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CBDCA AUC 5(d 1, 20日) |
| | アテゾリスマブ + PEM/CDDP | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日), PEM 500mg/m2(d 1, 20日), CDDP 75mg/m2(d 1, 20日) |
| | アテゾリスマブ + nabPTX/CBDCA(AUC6) | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日), nabPTX 100mg/m2(d 1・8・15, 6日), CBDCA AUC 6(d 1, 20日) |
| 小細胞肺癌 | アテゾリスマブ | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日) |
| | AMR | AMR 45mg/m2(d 1~3, 18日) |
| | CPT-11/CBDCA(AUC5) | CPT-11 50mg/m2(d 1・8・15, 13日), CBDCA AUC5(d 1, 27日) |
| | VP-16/CBDCA(AUC5) | VP-16 80mg/m2(d 1~3, 18日), CBDCA AUC5(d 1, 20日) |
| | CPT-11 | CPT-11 100mg/m2(d 1・8・15, 13日) |
| | CPT-11/CDDP | CPT-11 60mg/m2(d 1・8・15, 13日), CDDP 60mg/m2(d 1, 27日) |
| | アテゾリスマブ + VP-16/CBDCA(AUC5) | アテゾリスマブ 1200mg/body(d 1, 20日), VP-16 80mg/m2(d 1~3, 18日), CBDCA AUC5(d 1, 20日) |
| | CDDP/VP-16 | VP-16 100mg/m2(d 1~3, 18日), CDDP 80mg/m2(d 1, 20日) |
| 胸腺癌 | ADOC | DXR 40mg/m2(d 1, 20日), CDDP 50mg/m2(d 1, 20日), VCR 0.6mg/m2(d 3, 18日), CPA 700mg/m2(d 4, 17日) |

化学療法レジメン

| 消化器領域 | | |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胆道癌 | GEM | GEM 1000mg/m2(d 1・8・15, 休13日) |
| | GEM/CDDP | CDDP 25mg/m2(d 1・8, 休13日), GEM 1000mg/m2(d 1・8, 休13日) |
| 大腸癌 | m-FOLFOX6 | L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | FOLFIRI | CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | CPT-11 | CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日) |
| | IRIS | S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休13日), CPT-11 125mg/m2(d 1・15, 休13日) |
| | I-LV/5-FU | I-LV 250mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日), 5-FU 600mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日) |
| | XELIRI | Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), CPT-11 200mg/m2(d 1, 休20日) |
| | Bmab+mFOLFOX6 | Bmab 5mg/kg(d 1, 休13日), L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | Bmab+FOLFIRI | Bmab 5mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | Bmab+CPT-11 | Bmab 5mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日) |
| | Bmab+IRIS | Bmab 5mg/kg(d 1, 休13日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休13日), CPT-11 125mg/m2(d 1・15, 休13日) |
| | Bmab+XELOX | Bmab 7.5mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | Bmab+SOX | Bmab 7.5mg/kg(d 1, 休20日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | Bmab+I-LV/5-FU | Bmab 5mg/kg(d 1・15・29・43, 休13日), I-LV 250mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日), 5-FU 600mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日) |
| | Bmab+Cape | Bmab 7.5mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日) |
| | Bmab+TAS102 | Bmab 5mg/kg(d 1・15, 休13日), TAS102 70mg/m2/日(d 2~6・9~13, 休15日) |
| | Bmab+XELIRI | Bmab 7.5mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), CPT-11 200mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 初回のみCmab(Day1・8) | Cmab 400mg/m2(d 1), Cmab 250mg/m2(d 8, 休6日) |
| | 2回目以降Cmab | Cmab 250mg/m2(d 1, 休6日) |
| | 2回目以降Cmab+mFOLFOX6 | Cmab 250mg/m2(d 1・8, 休6日), L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | 2回目以降Cmab+FOLFIRI | Cmab 250mg/m2(d 1・8, 休6日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | 2回目以降Cmab+CPT-11 | Cmab 250mg/m2(d 1・8, 休6日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日) |
| | 2回目以降Cmab+IRIS | Cmab 250mg/m2(d 1・8・15・22, 休6日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休13日), CPT-11 125mg/m2(d 1・15, 休13日) |
| | 2回目以降Cmab+XELOX | Cmab 250mg/m2(d 1・8・15, 休6日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 2回目以降Cmab+SOX | Cmab 250mg/m2(d 1・8・15, 休6日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 2回目以降Cmab+I-LV/5-FU | Cmab 250mg/m2(d 1・8・15・22・29・36・43・50, 休6日), I-LV 250mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日), 5-FU 600mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日) |
| | 2回目以降Cmab+XELIRI | Cmab 250mg/m2(d 1・8・15, 休6日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), CPT-11 200mg/m2(d 1, 休20日) |
| | Pmab | Pmab 6mg/kg(d 1, 休13日) |
| | Pmab+mFOLFOX6 | Pmab 6mg/kg(d 1, 休13日), L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | Pmab+FOLFIRI | Pmab 6mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | Pmab+CPT-11 | Pmab 6mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日) |
| | Pmab+IRIS | Pmab 6mg/kg(d 1・15, 休13日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休13日), CPT-11 125mg/m2(d 1・15, 休13日) |
| | Pmab+I-LV/5-FU | Pmab 6mg/kg(d 1・15・29・43, 休13日), I-LV 250mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日), 5-FU 600mg/m2(d 1・8・15・22・29・36, 休20日) |
| | RAM+FOLFIRI | RAM 8mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | 脱感作レジメンmFOLFOX6 | L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | FOLFOXIRI | CPT-11 165mg/m2(d 1, 休13日), L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 3200mg/m2(d 1, 48hr, 休13日) |
| | Bmab+FOLFOXIRI | Bmab 5mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 165mg/m2(d 1, 休13日), L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 3200mg/m2(d 1, 48hr, 休13日) |
| | Afb+FOLFIRI | Afb 4mg/kg(d 1, 休13日), CPT-11 150mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | SOX | S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | XELOX | Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| クローン病 | インリキシマブ(1-3回) | インリキシマブ 5mg/kg(d 1・15・43, 休55日) |
| | インリキシマブ(4回目以降) | インリキシマブ 5mg/kg(d 1, 休55日) |
| 食道癌 | FP(800/80) | 5-FU 800mg/m2(d 1~5, 休23日), CDDP 80mg/m2(d 1, 休27日) |
| | DTX | DTX 70mg/m2(d 1, 休20日) |
| | RT併用FP(700/70) | 5-FU 700mg/m2(d 1~4, 休24日), CDDP 70mg/m2(d 1, 休27日) |
| | ニホルマブ | ニホルマブ 240mg/body(d 1, 休13日) |
| 胃癌 | m-FOLFOX6 | L-OHP 85mg/m2(d 1, 休13日), I-LV 200mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 400mg/m2(d 1, 休13日), 5-FU 2400mg/m2(d 1, 46hr, 休13日) |
| | SP | S1 80mg/m2/日(d 2~22, 休13日), CDDP 60mg/m2(d 8, 休27日) |
| | XP | Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), CDDP 80mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 初回のみHER+XP | HER 8mg/kg(d 1, 休21日), Cape 2000mg/m2/日(d 3~16, 休6日), CDDP 80mg/m2(d 2, 休20日) |
| | 2回目以降HER+XP | HER 8mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), CDDP 80mg/m2(d 1, 休20日) |
| | SOX | S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 初回のみHER+SOX | HER 8mg/kg(d 1, 休20日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 2回目以降HER+SOX | HER 8mg/kg(d 1, 休20日), S1 80mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | XELOX | Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 初回のみHER+XELOX | HER 8mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 2回目以降HER+XELOX | HER 8mg/kg(d 1, 休20日), Cape 2000mg/m2/日(d 2~15, 休6日), L-OHP 130mg/m2(d 1, 休20日) |
| | 初回のみHER | HER 8mg/kg(d 1, 休20日) |
| | 2回目以降HER | HER 8mg/kg(d 1, 休20日) |
| | RAM+PTX | RAM 8mg/kg(d 1・15, 休13日), PTX 80mg/m2(d 1・8・15, 休13日) |

化学療法レジメン

| | | |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | RAM | RAM 8mg/kg(d 1・15,休13日) |
| | Weekly PTX | PTX 80mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| | PTX/S1 | S1 80mg/m2/日(d 2~15,休6日),PTX 50mg/m2(d 1・8,休13日) |
| | nabPTX | nabPTX 260mg/m2(d 1,休20日) |
| | Weekly nabPTX | nabPTX 100mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| | CPT-11 | CPT-11 150mg/m2(d 1・15・29,休20日) |
| | CPT-11/CDDP | CPT-11 60mg/m2(d 1,休13日),CDDP 30mg/m2(d 1,休13日) |
| | DTX | DTX 60mg/m2(d 1,休20日) |
| | DTX/S1 | DTX 40mg/m2(d 1,休20日),S1 80mg/m2(d 2~15,休6日) |
| | RAM+nabPTX | RAM 8mg/kg(d 1・15,休13日),nabPTX 100mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| | ニホ`ルマフ` | ニホ`ルマフ` 240mg/body(d 1,休13日) |
| 肝癌 | RAM | RAM 8mg/kg(d 1・15,休13日) |
| 肺癌 | GEM | GEM 1000mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| | S1/GEM | S1 60mg/m2/日(d 2~15,休6日),GEM 1000mg/m2(d 1・8,休13日) |
| | nabPTX/GEM | nabPTX 125mg/m2(d 1・8・15,休6日),GEM 1000mg/m2(d 1・8・15,休6日) |
| | FOLFIRINOX | L-OHP 85mg/m2(d 1,休13日),I-LV 200mg/m2(d 1,休13日),CPT-11 180mg/m2(d 1,休13日),5-FU 400mg/m2(d 1,休13日),5-FU 2400mg/m2(d 1,46hr,休13日) |
| 潰瘍性大腸炎 | インフリキシマフ`(1-3回) | インフリキシマフ` 5mg/kg(d 1・15・43,休55日) |
| | インフリキシマフ`(4回目以降) | インフリキシマフ` 5mg/kg(d 1,休55日) |

化学療法レジメン

| 血液領域 | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再生不良性貧血 | サイモグロブリン | サイモグロブリン 2.5mg/kg(d 1~5) |
| 急性リンパ球性白血病 | JALSG Ph+ ALL213地固め療法 C1 | MTX 1000mg/m2(d 1,休23日),AraC 1000mg/m2×2回/日(d 2~3,休21日),mPSL 50mg/body(d 1~3,休21日),ダサチニブ100mg/body(d 4-24) |
| | JALSG Ph+ ALL213地固め療法 C2 | DNR 45mg/m2(d 1,休21日),VCR 1.3mg/m2(d 1,休21日),CPA 1200mg/m2(d 1,休21日),PSL 60mg/m2(d 1~7,休15日),PSL 30mg/m2(d 8~9,休13日),PSL 15mg/m2(d 10~11,休11日),PSL 5mg/m2(d 12~14,休8日),ダサチニブ100mg/body(d 2-22) |
| | JALSG ALL VCR | VCR 1.3mg/m2(d 1,休34日) |
| 急性骨髄性白血病 | マイロゲ | ゲムツスマブ・オゾガマイン 9mg/m2(d 1,休13日) |
| | ミキサントロン | MIT 6mg/m2(d 1,休6日) |
| | IDA/AraC(寛解導入) | IDA 12mg/m2(d 1~3,休25日),AraC 100mg/m2(d 1~7,休21日) |
| | DNR/AraC(寛解導入) | DNR 50mg/m2(d 1~5,休23日),AraC 100mg/m2(d 1~7,休21日) |
| | AraC大量(地固め) | AraC 2000mg/m2×2回/日(d 1~5,休16日) |
| | MIT/AraC(地固め1) | MIT 7mg/m2(d 1~3,休25日),AraC 200mg/m2(d 1~5,休23日) |
| | DNR/AraC(地固め2) | DNR 50mg/m2(d 1~3,休25日),AraC 200mg/m2(d 1~5,休23日) |
| | ACR/AraC(地固め3) | ACR 20mg/m2(d 1~5,休23日),AraC 200mg/m2(d 1~5,休23日) |
| | A triple V(地固め4) | AraC 200mg/m2(d 1~5,休23日),VP-16 100mg/m2(d 1~5,休23日),VCR 0.8mg/m2(d 8,休20日),VDS 2mg/m2(d 10,休18日) |
| | CA | ACR 14mg/m2(d 1~4,休24日),AraC 10mg/m2×2回/日(d 1~14,休14日) |
| | mini-MEC | MIT 8mg/m2(d 1~3,休18日),VP-16 100mg/m2(d 1~5,休16日),AraC 100mg/m2(d 1~7,休14日) |
| | AraC先行(寛解導入) | AraC 100mg/m2(d 1~7,休14日) |
| 急性前骨髄性白血病 | IDA/AraC(寛解導入) | IDA 12mg/m2(d 1~3,休25日),AraC 100mg/m2(d 1~7,休21日) |
| | DNR/AraC(地固め2) | DNR 50mg/m2(d 1~3,休25日),AraC 200mg/m2(d 1~5,休23日) |
| | AraC先行(寛解導入) | AraC 100mg/m2(d 1~7,休14日) |
| | 三酸化二ヒ素 | 三酸化二ヒ素 0.15mg/kg(d 1~5,休2日) |
| | GO | ゲムツスマブ・オゾガマイン 4mg/m2(d 1,休13日) |
| 成人T細胞性白血病 | モカリスマブ | モカリスマブ 1mg/kg(d 1,休6日) |
| | VCAP(mLSG15) | DXR 40mg/m2(d 1,休6日), VCR 1mg/m2(d 1,休6日), CPA 350mg/m2(d 1,休6日), PSL 40mg/m2(d 1,休6日) |
| | AMP(mLSG15) | DXR 30mg/m2(d 1,休6日), MCNU 60mg/m2(d 1,休6日),PSL 40mg/m2(d 1,休6日) |
| | VECP(mLSG15) | VDS 2.4mg/m2(d 1,休13日),VP-16 100mg/m2(d 1~3,休11日),CBDCA 250mg/m2(d 1,休13日),PSL 40mg/m2(d 1~3,休11日) |
| | 髄注 | MTX/AraC/DEX髄腔内注入 MTX 15mg/body+AraC 40mg/body+DEX4mg/body(d 1) |
| ホジキンリンパ腫 | ABVD | DXR 25mg/m2(d 1・15,休13日),VBL 6mg/m2(d 1・15,休13日),BLM 9mg/m2(d 1・15,休13日),DTIC 250mg/m2(d 1・15,休13日) |
| | (B)EACOPP | PCZ 100mg/m2(d 1~7,休14日),VP-16 100mg/m2(d 1~3,休18日),DXR 25mg/m2(d 1,休20日),CPA 650mg/m2(d 1,休20日),VCR 1.4mg/m2(d 8,休13日), PSL 40mg/m2(d 1~14,休7日) |
| | ニボルマブ | ニボルマブ 240mg/body(d 1,休13日) |
| | A+AVD | ブレツキシマブヘドチン 1.2mg/kg(d 1・15,休13日),DXR 25mg/m2(d 1・15,休13日),VBL 6mg/m2(d 1・15,休13日),DTIC 250mg/m2(d 1・15,休13日) |
| IITP | リツキサン | RIT 375mg/m2(d 1,休6日) |
| リンパ腫 | PBSCT+LEED | CPA 60mg/kg(d 1~2),VP-16 500mg/m2(d 1~3),L-PAM 130mg/m2(d 4),DEX 40mg/body(d 1~4) |
| | PBSCH+VP-16大量,PSL 30mg/body(d 1~3) | VP-16 500mg/m2(d 1~3) |
| | アドセリス | ブレツキシマブヘドチン 1.8mg/kg(d 1,休20日) |
| 骨髄異形性症候群 | アザチチン(点滴) | アザチチン 75mg/m2(d 1~7,休21日) |
| | アザチチン(皮下) | アザチチン 75mg/m2(d 1~7,休21日) |
| 多発性骨髄腫 | ホルテゾミブ | ホルテゾミブ 1.3mg/m2(d 1・4・8・11,休10日),DEX 20mg/回(d 1~2・4~5・8~9・11~12,休9日) |
| | 週1回ホルテゾミブ | ホルテゾミブ 1.3mg/m2(d 1・8・15・22,休13日),DEX 20mg/回(d 1・8・15・22,休13日) |
| | ERd(1コース目) | エロツスマブ 10mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1・8・15・22,休6日) |
| | ERd(2コース目) | エロツスマブ 10mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1・8・15・22,休6日) |
| | ERd(3コース目以降) | エロツスマブ 10mg/kg(d 1・15,休13日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1・15,休13日),DEX 40mg/回(d 8・22,休6日) |
| | DLd(1コース目) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 20mg/回(d 1~2・8~9・15~16・22~23,休5日) |
| | DLd(2コース目) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 20mg/回(d 1~2・8~9・15~16・22~23,休5日) |
| | DLd(3~6コース目) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1・15,休13日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 20mg/回(d 1~2・8~9・15~16・22~23,休5日) |
| | DLd(7コース目以降) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1,休27日),レナリドシト 25mg/日(d 1~21,休7日),DEX 20mg/回(d 1~2・8~9・15~16・22~23,休5日) |
| | VAD | DXR 9mg/m2(d 1~4,休24日)+VCR 0.4mg/body(d 1~4,休24日),DEX 40mg/回(d 1~4・9~12・17~20,休8日) |
| | HD-CY | CPA 2000mg/m2(d 1~2,休19日) |
| | MEL200 | L-PAM 100mg/m2(d 1~2,休19日) |
| | DMPB(1コース目) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1・8・15・22・29・36,休6日),ホルテゾミブ 1.3mg/m2(d 1・4・8・11・22・25・29・32,休10日),L-PAM 6mg/m2(d 1~4,休38日),DEX 20mg/回(d 1・8・15・22・29・36,休6日),PSL 40mg/m2(d 2~4,休38日) |
| | DMPB(2~9コース目) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1・22,休20日),ホルテゾミブ 1.3mg/m2(d 1・8・22・29,休13日),L-PAM 6mg/m2(d 1~4,休38日),DEX 20mg/回(d 1・22,休20日),PSL 40mg/m2(d 2~4,休38日) |
| | DMPB(10コース目以降) | ダラツムマブ 16mg/kg(d 1,休27日),DEX 20mg/回(d 1,休27日) |
| | PACE | DXR 10mg/m2(d 1~4,休17日),CDDP 10mg/m2(d 1~4,休17日)+VP-16 40mg/m2(d 1~4,休17日)+CPA 400mg/m2(d 1~4,休17日), |
| | EPd(1コース目) | エロツスマブ 10mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),ホマリドシト 4mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1・8・15・22,休6日) |
| | EPd(2コース目) | エロツスマブ 10mg/kg(d 1・8・15・22,休6日),ホマリドシト 4mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1・8・15・22,休6日) |
| | EPd(3コース目) | エロツスマブ 20mg/kg(d 1,休27日),ホマリドシト 4mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1,休27日),DEX 40mg/回(d 8・15・22,休6日) |
| EPd(4コース目以降) | エロツスマブ 20mg/kg(d 1,休27日),ホマリドシト 4mg/日(d 1~21,休7日),DEX 28mg/回(d 1,休27日),DEX 40mg/回(d 8・15・22,休6日) | |
| weekly Kd(1コース目) | カルフィゾミブ 20mg/m2(d 1,休27日),カルフィゾミブ 70mg/m2(d 8・15,休13日),DEX 40mg/回(d 1・8・15・22,休6日) | |
| weekly Kd(2コース目以降) | カルフィゾミブ 70mg/m2(d 1・8・15,休13日),DEX 40mg/回(d 1・8・15・22,休6日) | |
| 非ホジキンリンパ腫 | GCP | CDDP 75mg/m2(d 1,休20日),GEM 1000mg/m2(d 1・8,休13日),DEX 40mg/body(d 1~4,休17) |
| | GCD | CBDCA AUC5(d 1,休20日),GEM 1000mg/m2(d 1・8,休13日),DEX 40mg/body(d 1~4,休17) |
| | GD | GEM 1000mg/m2(d 1・8・15,休13日) |

化学療法レジメン

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASE | CPA 1200mg/m2(d 1,休20日),VP-16 100mg/m2(d 1~3,休18日),AraC 2000mg/m2(d 2~3,休18日),DEX 40mg/body(d 1~3,休18日) |
| リツキシマブ | RIT 375mg/m2(d 1,休6日) |
| CHOP | DXR 50mg/m2(d 1,休20日), VCR 1.4mg/m2(d 1,休20日), CPA 750mg/m2(d 1,休20日), PSL 100mg/body(d 1~5,休16日) |
| THPCOP | THP 30mg/m2(d 1,休20日), VCR 1mg/m2(d 1,休20日), CPA 500mg/m2(d 1,休20日), PSL 30mg/m2(d 1~5,休16日) |
| MVCP | MIT 8mg/m2(d 1,休20日),VP-16 100mg/m2(d 1~3,休18日),CBDCA 300mg/m2(d 1,休20日),PSL 40mg/m2(d 1~5,休16日) |
| VICP | VP-16 100mg/m2(d 1~3,休18日),IFM 1.5g/m2(d 1~3,休18日), CBDCA 300mg/m2(d 1,休20日),PSL 40mg/m2(d 1~5,休16日) |
| EPOCH | DXR 10mg/m2(d 1~4,休17日)+VP-16 50mg/m2(d 1~4,休17日)+VCR 0.4mg/m2(d 1~4,休17日),PSL 60mg/m2(d 1~5,休16日),CPA 750mg/m2(d 5,休16日) |
| VBL | VBL 0.1mg/kg(d 1,休6日) |
| ASHAP | mPSL 500mg/body(d 1~5,休16日),DXR 10mg/m2(d 1~4,休17日)+CDDP 25mg/m2(d 1~4,休17日),Ara-C 2000mg/m2(d 5,休16日) |
| FM(フルタラ/MIT)療法 | フルタラピン 25mg/m2/日(d 1~3,休25日),MIT 12mg/m2(d 1,休27日) |
| hyper CVAD療法Aコース | DEX 40mg/body(d 1~4,11~14,休7日),CPA 300mg/m2 × 2回/日(d 1~3,休18日),DXR 25mg/m2(d 4,休17日),VCR 2mg/body(d 4・11,休10日) |
| hyper CVAD療法Bコース | MTX 1000mg/m2(d 1,休20日),AraC 3000mg/m2 × 2回/日(d 2~3,休18日),mPSL 250mg/body(d 2~3,休18日) |
| ヘンダムスチン | ヘンダムスチン 120mg/m2(d 1~2,休19日) |
| ヘンダムスチン(リツキシマブ併用) | ヘンダムスチン 90mg/m2(d 1~2,休26日) |
| MTX大量 | MTX 3000mg/m2(d 1,休13日) |
| BAC | ヘンダムスチン 70mg/m2(d 1~2,休26日),AraC 500mg/m2(d 1~3,休25日) |
| V-CAP | ホルテゾミブ 1.3mg/m2(d 1・4・8・11,休10日),CPA 750mg/m2(d 2,休19日),DXR 50mg/m2(d 2,休19日),PSL 100mg/body(d 2~6,休15日) |
| ACES | mPSL 500mg/body(d 1~5,休16日),VP-16 80mg/m2(d 2~4,休17日),CBDCA 100mg/m2(d 1~4,休17日),Ara-C 2000mg/m2(d 5,休16日) |
| ロシテブシン | ロシテブシン14mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| FND | フルタラピン 25mg/m2(d 1~3,休25日),MIT 10mg/m2(d 1,休27日),DEX 20mg/body(d 1~5,休13日) |
| FC | フルタラピン 25mg/m2(d 1~3,休25日),CPA 250mg/m2(d 1~3,休25日) |
| A+CHP | ブレソキシマブヘドチン 1.8mg/kg(d 1,休20日),CPA 750mg/m2(d 1,休20日),DXR 50mg/m2(d 1,休20日),PSL 100mg/body(d 1~5,休16日) |

化学療法レジメン

| 乳腺領域 | | |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 乳癌 | 1回連続PTX | PTX 80mg/m2(d 1・8・15,休6日) |
| | FEC75 | EPI 75mg/m2(d 1,休20日),CPA 500mg(d 1,休20日),5-FU 500mg(d 1,休20日) |
| | FEC 100 | EPI 100mg/m2(d 1,休20日),CPA 500mg/m2(d 1,休20日),5-FU 500mg/m2(d 1,休20日) |
| | TC | DTX 75mg/m2(d 1,休20日),CPA 600mg/m2(d 1,休20日) |
| | DTX(FEC→DTX) | DTX 75mg/m2(d 1,休20日) |
| | Triweekly DTX | DTX 60mg/m2(d 1,休20日) |
| | 3週毎HER(初回のみ) | トラス`マフ` 8mg/kg(d 1,休20日) |
| | 3週毎HER(2回目以降) | トラス`マフ` 6mg/kg(d 1,休20日) |
| | HER/PTX(初回のみ) | HER 8mg/kg(d 1,休20日),PTX 80mg/m2(d 1・8・15,休6日) |
| | HER/PTX(2回目以降) | HER 6mg/kg(d 1,休20日),PTX 80mg/m2(d 1・8・15,休6日) |
| | GEM | GEM 1250mg/m2(d 1・8,休13日) |
| | GT | GEM 1250mg/m2(d 1・8,休13日),PTX 175mg/m2(d 1,休20日) |
| | HER/DTX(初回のみ) | HER 8mg/kg(d 1,休20日),DTX 75/m2(d 1,休20日) |
| | HER/DTX(2回目以降) | HER 6mg/kg(d 1,休20日),DTX 75/m2(d 1,休20日) |
| | PER/HER/DTX(初回のみ) | PER 840mg/body(d 1,休20日),HER 8mg/kg(d 1,休20日),DTX 75/m2(d 1,休20日) |
| | PER/HER/DTX(2回目以降) | PER 420mg/body(d 1,休20日),HER 6mg/kg(d 1,休20日),DTX 75/m2(d 1,休20日) |
| | Bmab+PTX | PTX 90mg/m2(d 1・8・15,休13日),Bmab 10mg/kg(d 1・15,休13日) |
| | エリフ`リン | エリフ`リン 1.4mg/m2(d 1・8,休13日) |
| | T-DM1 | T-DM1 3.6mg/kg(d 1,休20日) |
| | Weekly PTX | PTX 80mg/m2(d 1・8・15,休13日) |
| | nabPTX | nabPTX 260mg/m2(d 1,休20日) |

化学療法レジメン

| リウマチ関連 | | |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キヌスルマン病 | トシリス`マブ(60分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 13日) |
| | トシリス`マブ(30分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 13日) |
| 血管炎 | トシリス`マブ(60分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 13日) |
| | トシリス`マブ(30分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 13日) |
| | CPA | CPA 500mg/body(d 1, 13日) |
| | リツキシマブ | RIT 375mg/m2(d 1, 6日) |
| 乾癬 | インフリキシマブ(1-3回) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1・15・43, 55日) |
| | インフリキシマブ(4回目以降) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1, 55日) |
| | インフリキシマブ(6回目以降) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1, 55日) |
| 関節リウマチ | リツキシマブ | RIT 375mg/m2(d 1, 6日) |
| | アハ`タセプト(1-2回目) | アハ`タセプト 10mg/kg(d 1, 13日) |
| | アハ`タセプト(3回目以降) | アハ`タセプト 10mg/kg(d 1, 27日) |
| | トシリス`マブ(60分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 17日) |
| | トシリス`マブ(30分) | トシリス`マブ 8mg/kg(d 1, 17日) |
| | インフリキシマブ(4回目以降) | インフリキシマブ 3mg/kg(d 1, 55日) |
| 泌尿器領域 | | |
| 尿路上皮癌 | M-VAC | MTX 30mg/m2(d 1・15・22, 26日), VBL 3mg/m2(d 2・15・22, 26日), DXR 30mg/m2(d 2, 26日), CDDP 70mg/m2(d 2, 26日) |
| | GEM/CBDCA(AUC5) | GEM 1000mg/m2(d 1・8・15, 13日), CBDCA AUC 5(d 2, 26日) |
| | TG | PTX 110mg/m2(d 1・8・15, 13日), GEM 1000mg/m2(d 1・8・15, 13日) |
| | GC | GEM 1000mg/m2(d 1・8・15, 13日), CDDP 70mg/m2(d 2, 26日) |
| | PTX/GEM/CBDCA | PTX 70mg/m2(d 1・8, 13日), GEM 1000mg/m2(d 1・8, 13日), CBDCA AUC 5(d 1, 20日) |
| | CDDP/VP-16 | VP-16 100mg/m2(d 1-3, 18日), CDDP 80mg/m2(d 1, 20日) |
| | ヘム`ロリス`マブ | ヘム`ロリス`マブ 200mg/body(d 1, 20日) |
| 胚細胞腫 | VIP | CDDP 20mg/m2(d 1-5, 16日), VP-16 750mg/m2(d 1-5, 16日), IFM 1.2g/m2(d 1-5, 16日) |
| | BEP | CDDP 20mg/m2(d 1-5, 16日), VP-16 100mg/m2(d 1-5, 16日), BLM 30mg/body/日(d 1・8・15, 16日), |
| | TIP | PTX 210mg/m2(d 1, 20日), IFM 1.5g/m2(d 2-5, 16日), CDDP 25mg/m2(d 2-5, 16日) |
| 前立腺癌 | DP | DTX 75mg/m2(d 1, 20日), PSL 10mg朝/日連日 |
| | CTX+PSL | CTX 25mg/m2(d 1, 20日), PSL 10mg朝/日連日 |
| 腎癌 | テムシロリムス | テムシロリムス 25mg/body(d 1, 6日) |
| | ニホ`ルマブ+イヒ`リムマブ | ニホ`ルマブ 240mg/body(d 1, 20日), イヒ`リムマブ 1mg/kg(d1, 20日) |
| | ニホ`ルマブ | ニホ`ルマブ 240mg/body(d 1, 13日) |
| 脳領域 | | |
| 悪性神経膠腫 | Bmab | Bmab 15mg/kg(d 1, 20日) |
| 皮膚領域 | | |
| 血管肉腫 | Weekly PTX | PTX 80mg/m2(d 1・8・15, 13日) |
| ハンジエト病 | DTX | DTX 60mg/m2(d 1, 20日) |
| 乾癬 | インフリキシマブ(1-3回) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1・15・43, 55日) |
| | インフリキシマブ(4回目以降) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1, 55日) |
| | インフリキシマブ(6回目以降) | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1, 55日) |
| | ヒミケート | インフリキシマブ 5mg/kg(d 1, 55日) |
| 悪性黒色腫 | ニホ`ルマブ+イヒ`リムマブ | ニホ`ルマブ 80mg/body(d 1, 20日), イヒ`リムマブ 3mg/kg(d1, 20日) |
| | ニホ`ルマブ | ニホ`ルマブ 240mg/body(d 1, 13日) |

化学療法レジメン

| 婦人科領域 | | |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子宮頸癌 | PTX/CBDCA(AUC 6) | PTX 175mg/m ² (d 1,休20日),CBDCA AUC 6(d 1,休20日) |
| | Bmab+CPA | Bmab 15mg/kg(d 1,休20日),CPA 50mg/body(d 1~21日) |
| 子宮体癌 | PTX/CBDCA(AUC 6) | PTX 175mg/m ² (d 1,休20日),CBDCA AUC 6(d 1,休20日) |
| 卵巣癌 | PTX/CBDCA(AUC 6) | PTX 180mg/m ² (d 1,休20日),CBDCA AUC 6(d 1,休20日) |
| | PTX/CBDCA(AUC 6)+Bmab | PTX 175mg/m ² (d 1,休20日),CBDCA AUC 6(d 1,休20日),Bmab 15mg/kg(d 1,休20日) |
| | Bmab維持 | Bmab 15mg/kg(d 1,休20日) |
| その他 | | |
| 原発不明癌 | PTX/CBDCA(AUC 6) | PTX 200mg/m ² (d 1,休20日),CBDCA AUC 6(d 1,休20日) |
| | FP(1000/80) | 5-FU 1000mg/m ² (d 1~5,休16日),CDDP 80mg/m ² (d 1,休20日) |
| 胚細胞腫 | MEA | MTX 150mg/body(d 1,休13日),MTX 300mg/body(d 1,休13日),アクチマイシンD 0.5mg/body(d 1~5,休9日),VP-16 100mg/body(d 1~5,休9日) |
| 頭頸部癌 | ニボルマブ | ニボルマブ 240mg/body(d 1,休13日) |
| 神経内分泌腫瘍 | スレプトゾシン | スレプトゾシン 500mg/m ² (d 1~5,休37日) |
| その他 | ベムブロキサマブ | ベムブロキサマブ 200mg/body(d 1,休20日) |
| 軟部肉腫 | エリブリン | エリブリン 1.4mg/m ² (d 1・8,休13日) |
| | DXR | DXR 75mg/m ² (d 1,休20日) |
| | AI | DXR 25mg/m ² (d 1~3,休18日),IFM 2.5g/m ² (d 1~4,休17日) |

略語一覧

| 略語 | 一般名 | 商品名(採用品) |
|---------|----------------------|------------------|
| ACNU | ニムスチン | ニトラン |
| ACR | アクリルピシチン | アクリシリン |
| Afb | アフリヘルセプトヘーダ | ザルトラップ |
| AMR | アムルピシチン | カルセト |
| AraC | シタラピチン | キロサイド、シタラピチン |
| ATRA | トレチノイン | ヘサノイド |
| BLM | ブレオマイシン | ブレオ |
| Bmab | ヘパシスマブ | アバステチン |
| BUS | ブスルファチン | マブリン |
| Cape | カペシタピチン | ゼローダ、カペシタピチン |
| CBDCA | カルボプラチン | カルボプラチン |
| CDDP | シスプラチン | シスプラチン |
| CDGP | ネダプラチン | アクフラ |
| CPA | シクロホスファミド | エントキサン |
| CPT-11 | イリノテカン | カンフト |
| Cmab | セツキシマブ | アービタックス |
| CTX | カハシタキセル | シェブタナ |
| DEX | デキサメタゾン | デキサート |
| 5'-DFUR | ドキシフルリジチン | フルツロン |
| DNR | ダウノマイシン | ダウノマイシン |
| DTX | ドセタキセル | ドセタキセル |
| DTIC | タカルバシチン | タカルバシチン |
| DXR | ドキシソルピシチン | ドキシソルピシチン |
| EMP | エストラムスチン | エストラサイト |
| EPI | エピルピシチン | エピルピシチン |
| EXE | エキセメスタン | アロマシチン |
| 5FU | フルオロウラシル | フルオロウラシル |
| GEM | ゲムシタピチン | ゲムシタピチン |
| GLI | イマチニブ | グリベック |
| HER | トラスツスマブ | ハーセプチン、トラスツスマブBS |
| HU | ヒドロキシカルバミド | ハイトレア |
| IDR | イダルビシチン | イダルマイシン |
| IFM | イホスファミド | イホマイト |
| L-ASP | ルーアスハラキナーゼ | ロイナーゼ |
| I-LV | レボホリナートカルシウム | レボホリナート |
| L-OHP | オキサリプラチン | エルフラット |
| L-PAM | メルファラン | アルケラン |
| MCNU | ラニムスチン | サイメリン |
| MIT | ミトキサントロン | ノバントロン |
| 6-MP | メルカプトプリン | ロイケリン |
| MPA | メドロキシプロゲステロン | ヒスロンH |
| mPSL | メチルプレドニゾロン | ソルメドロール |
| MST-16 | ソブゾキサン | ヘラゾリン |
| MTX | メトトレキサート | メソトレキサート |
| nabPTX | ハクリタキセル(アルブミン懸濁型) | アブラキサン |
| PCZ | プロカルバシチン | プロカルバシチン |
| PEP | ヘプロマイシン | ヘプロオ |
| PEM | ヘメトレキサート | アリムタ |
| PER | ペルツスマブ | パージェタ |
| Pmab | パニツムマブ | ヘクティベックス |
| PSL | プレドニゾロン | プレドニン |
| PTX | ハクリタキセル | ハクリタキセル |
| RAM | ラムシルマブ | サイラムザ |
| RIT | リツキシマブ | リツキサン、リツキシマブBS |
| TAM | タモキシフェン | ノルバデックス |
| T-DM1 | トラスツスマブ・エムタンシン | カトサイラ |
| THP | テラルピシチン | テラルピシチン |
| TOR | トレミフェン | フェアストン |
| TMZ | テモゾロミド | テモゾロミド |
| S1 | テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム | エスエーワン |
| UFT | ウラシル・テカフル | ユーエフティ |
| VBL | ビンブラステチン | エクザール |
| VCR | ビンクリスチン | オンコピン |
| VDS | ビンデシチン | フィルデシチン |
| VNR | ビノレルピチン | ナベルピチン |
| VP-16 | イトホシト | ラストテットS、イトホシト |