

泌尿器科 研究業績 (2017年)

学会発表(特別・教育講演、シンポジウム含む)

1 ① 相原衣江 貝塚洋平 長澤誠司 福井浩二 古倉浩次

② 宝塚市立病院における女性骨盤臓器脱の治療方針とTVM手術成績についての検討

③ 口演

④ 第105回日本泌尿器科学会総会

⑤ 鹿児島

⑥ 2017.4.21

⑦ 女性の腹圧性尿失禁は、妊娠、出産、加齢、閉経などにより30代から増加し70代以上の経産婦では約50%に自覚症状を認める。骨盤底筋の脆弱化などの原因や、加療方法を中心に最近の話題を提供する。特に腹圧性尿失禁に対する手術療法、TOTやTVT手術は、中部尿道下面に経腔式に腹直筋または閉鎖孔へポリプロピレンテープを留置し半身麻酔で短時間で可能であり入院期間も短く、当院の手術成績や患者背景などをまとめたものを臨床的に検討し発表する。

2 ① 長澤誠司

② 精巣捻転症例における精巣白膜減張切開術の検討

③ 口演

④ 第27回性機能学会中部総会

⑤ 大阪

⑥

⑦

3 ① 相原衣江 長澤誠司 福井浩二 古倉浩次

② 宝塚市立病院におけるTUL術後発熱症例の臨床的検討

③ 口演

④ 第31回日本泌尿器内視鏡学会

⑤ 徳島

⑥ 2017.11.18

TUL後の発熱は75歳以上、90分以上の術時間を要する大きな結石、術前尿路感染有、尿管ステント有で生じやすく、特に78歳以上では敗血

⑦ 症を発症しやすいことが分かった。RRSにて患者状態の変化に迅速に対応し、血液培養検査から抗菌薬を再考し全例改善していたことが分かった。結語)TUL術後感染は患者年齢、手術時間、結石サイズ、術前感染に誘引されるが迅速な対応で改善が可能であった。

4 ① 滝内秀和 花咲 毅、 上田康生、福井浩二

② 腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における精嚢挙上器具の有用性

③ 口演

④ 第31回 日本泌尿器内視鏡学会総会

⑤ 徳島

⑥ 2017.11.18

⑦

5 ① 長澤誠司 福井浩二 相原衣江 古倉浩次

② 当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの使用経験

③ ポスター

④ 第67回日本泌尿器科学会中部総会

⑤ 大阪

⑥ 2017. 10. 26

⑦

6 ① 相原衣江

② 女性の尿失禁について

③ 口演

④ 宝塚医師会講演会

⑤ 宝塚

⑥ 2017/5/27

⑦ 女性の尿失禁である切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁について、原因や症状、骨盤底筋体操や薬物、神経刺激、手術療法などにつき詳しく講演した。

- 7 ① 相原衣江
② 女性の腹圧性尿失禁の治療について TOT・TVT手術を中心に
③
④ 第19回ED・OAB研究会
⑤ 神戸
⑥ 2017.8.24

⑦ 女性の腹圧性尿失禁は、妊娠、出産、加齢、閉経などにより30代から増加し70代以上の経産婦では約50%に自覚症状を認める。骨盤底筋の脆弱化などの原因や、治療方法を中心に最近の話題を提供する。特に腹圧性尿失禁に対する手術療法、TOTやTVT手術は、中部尿道下面に経腔式に腹直筋または閉鎖孔へポリプロピレンテープを留置し半身麻酔で短時間で可能であり入院期間も短く、当院の手術成績や患者背景などをまとめたものを臨床的に検討し発表する。